براندت سوبر 7

منظم درجة حموضة – 82.35%

المورد: براندت اوروبا
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات الأسمدة – منظم درجة حموضة

التركيب

المكوّن	النسبة
حمض البروبانويك وليسيثين وكحول إيثوكسيلات	82.35%

التعريف

منظم لدرجة الحموضة Ph محلول الرش مادة ناشرة ومخترقة لأسطح الأوراق مادة مانعة لانجراف قطرات محلول الرش

الخصائص والمميزات

- كحول إيثوكسلات Alcohol Ethaxylate
- تعمل على خفض التوتر السطحي مما يضمن توزيع متجانس علي سطح الأوراق.
- تضمن المواد الفعالة إختراق محلول الرش بدون التأثير على طبقة البشرة بأوراق النبات على عكس المواد الناشرة التقليدية ذات التأثير المضر بطبقة البشرة.
- تعمل علي معالجة عسر الماء في محلول الرش.
- ليسيثين Lecithin
- تعمل على تجانس قطرات محلول الرش عن طريق وصول قطرات محلول الرش للمدى المثالي
- (150-500 ميكرون) مما يؤدى لتقليل الفاقد الناتج من انجراف محلول الرش وتحسين كفاءة عملية الرش.
- يعمل على تجميع حبيبات التربة الخشنة مع المادة العضوية لتكوين مكون تربة قادرعلى الإحتفاظ بالمياه والمغذيات
- مما يجعلها أكثر ملاءمة لزيادة معدلات نمو النبات وذلك عند حقنه في التربة بمعدل 2 لتر للفدان مرة في الموسم
- مع الهيوميك والفولفيك فيزيد من كفائتهم ومدة بقائهم في التربة ويحسن من خصائص التربة
- حمض البروبانويك Propanoic Acid
- تعمل كضبط لدرجة حموضة pH محلول الرش وثباته لمده زمنيه أطول علي عكس منتجات السوق التي تعتمد علي الأحماض التقليديه كحمض النيتريك او الفوسفوريك والتي لا تضمن ثبات درجة حموضة محلول الرش لمدة زمنية طويلة .

معدلات الاستخدام

الرش الورقي

- 25 : 50 سم^3 / 100 لتر ماء
- الحقن الأرضي : 2 لتر / الفدان لزيادة قدرة التربة على الإحتفاظ بالمياه والمغذيات (مرة في الموسم)

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.