لوردر SC%17.5

مبيد حشري عام – إيميداكلوبراييد 12.5%

المورد: اجريساينسز تاريم
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات المبيدات — مبيدات حشرية

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
إيميداكلوبريد	12.5%
لامبدا سيهالوثرين	5%

التعريف

مبيد حشري مميز وفريد جهازي – غير جهازي – بالملامسة وبالبلع - لمكافحة العديد من الحشرات الماصة والقارضة على العديد من المحاصيل الزراعية

الخصائص والمميزات

- مبيد حشري جهازي وبالملامسة وعن طريق المعدة كما وله تأثير طارد للحشرات.
- مبيد فتاك وسريع القتل ويعطي حماية طويلة الأمد ويستخدم ضمن برامج المكافحة المتكاملة.
- يحافظ على المحصول من انتقال الفيروسات بالقضاء على الحشرات الناقلة.
- يتغلب على مقاومة الحشرات للمبيدات الأخرى ولا يتأثر المبيد بدرجات الحرارة وغسيل الأمطار.
- إزدياد درجة الحرارة عند المعاملة تزيد سمية المادة للحشرات وتعتبر مادة ثابتة في الماء والتربة والضوء.

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة المصرية

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
البطيخ	الذبابة البيضاء	75 سم^3 / 100 لتر ماء	7 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
الخيار	الذبابة البيضاء والمن و التربس والجاسيد	75 سم^3 / 100 لتر ماء	7 أيام
الطماطم البطاطس	الذبابة البيضاء والمن و التربس والجاسيد وصانعات الانفاق ودودة ثمار الطماطم	75 سم^3 / 100 لتر ماء	7 أيام
الموالح المانجو	المن والتربس والجاسيد الحشرات القشرية والبق الدقيقي	100 سم^3 / 100 لتر ماء 150 سم^3 / 100 لترماء	21 يوم

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ، وينصح بعمل تجربة خلط قبل الرش.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: (1- نيونيكوتينويد Neonicotinoid + 2- بايرثرويد Pyrethroid)