مودرنا نيلسون

زنك 13%

المورد: مودرنا أجريكولا
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات الأسمدة — مغذيات ورقية

التركيب

المكوّن	النسبة	المصدر
زنك	13%	مخلبي) مصدره ZN-EDTA

التعريف

مركب غذائي يمد النبات بعنصر الزنك الذي يلعب دوراً هاماً كمحفز للعمليات الحيوية كما أنه يعالج آثار نقص الزنك خاصة في الأراضي المالحة والكلسية بالإضافة إلى أنه يعزز انتشار انقسام الخلايا واستطالتها ويزيد حجم الثمار ويحفز الزنك تكوين الزهور ويزيد من حيوية حبوب اللقاح وكفاءة التلقيح والعقد مما يقلل من تساقط الثمار حديثة العقد.

الخصائص والمميزات

- يمد النبات بعنصر الزنك والذي يلعب دورًا مهمًا كعامل مساعد للعديد من الإنزيمات الهامة.
- يعالج بكفاءة أعراض نقص الزنك خاصة تحت ظروف التربة المالحة والجيرية.
- يشجع انقسام وإستطالة الخلايا وزيادة حجم الثمار.
- يحفز تكوين الأزهار ويزيد من حيوية حبوب اللقاح وكفاءة التلقيح والعقد مما يقلل من تساقط الثمار حديثة العقد.
- المركب أكثر ثباتًا ويبقى لفترة زمنية أطول مقارنة بطرق التخليب الأخرى.
- يزيد من قدرة النبات على المقاومة المستحثة لأمراض السكر العالي.

معدلات الاستخدام

الرش الورقي والتسميد الأرضي :

المحصول	معدل الإستخدام	ملاحظات
الخضروات	75 : 100 جم / 100 لتر ماء (رش) 500 جم / فدان (حقن)	يستخدم 2 : 3 مرات خلال دورة حياة المحصول وعند وجود أوراق كافية
أشجار الفاكهة، الموالح، العنب، أشجار الزيتون	100 : 150 جم / 100 لترماء (رش) 400 جم/ فدان (حقن)	يستخدم 2 : 3 مرات خلال دورة حياة المحصول
البطاطس والمحاصيل الدرنية	400 : 600 جم / فدان (حقن)	يستخدم عند ظهور أعراض النقص يستخدم بحد أدني 200 لتر/ فدان
المحاصيل الحقلية	400 : 600 جم / فدان (حقن)	يستخدم عند ظهور أعراض النقص يستخدم بحد أدنى 200 لتر/ فدان من مياه الري

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.