أورنيلا EC%50

مبيد نيماتودي جهازي وبالملامسة

المورد: استرانوفا تاريم
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات المبيدات — مبيدات نيماتودا

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
فوسثيازات	50%

التعريف

مبيد نيماتودي جهازي ويعمل بالملامسة يكافح طيف واسع من النيماتودا على مختلف النباتات.

الخصائص والمميزات

- أورنيلا: مبيد نيماتودا يعمل جهازي وبالملامسة وذو فعالية عالية حيث يقضي سريعاً على يرقات النيماتودا وله تأثير على مدى واسع من أنواع النيماتودا علي مختلف المحاصيل الحقلية و الخضر و أشجار الفاكهة
- أورنيلا: تأثيره ممتد المفعول في التربة وفعال بمعدلات منخفضة فيقضي على كل أطوار النيماتودا ويقلل إصابات النباتات بالآفات الثاقبة الماصة المتسببة في الأمراض الفيروسية
- أورنيلا: لا يتأثر بإختلافات درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة ومناسب لبرامج المكافحة المتكاملة حيث يكسر المناعة للمركبات الأخرى ويحافظ على الأعداء الحيوية وغير ضار على الخنافس المفترسة و النحل

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد (phi)
الموالح (أشجار مثمرة)	نيماتودا التدهور البطيء	1 لتر لكل فدان (مرتين)	30 يوم

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الإستعمال	فترة ما قبل الحصاد (phi)
الطماطم والبطاطس	نيماتودا تعقد الجذور	600 : 800 سم³ للفدان	30 يوم
العنب	نيماتودا تعقد الجذور	1 لتر / الفدان	60 يوم (الثمار والأوراق)
الموز	نيماتودا تعقد الجذور	1.5 لتر / الفدان	30 يوم

ملحوظة : يراعى عند تطبيقه على محصول العنب إستخدام المعدلات الموصى بها وطريقة الحقن في الري بالتنقيط في آخر نصف ساعة ري . ويمنع الري لمدة يوم بعد المعاملة ثم معاودة الري مرة أخرى رية غزيرة بعد 24 ساعة من توقيت المعاملة

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: الفوسفور العضوي Organophosphate