ستوريون EC%40

مبيد نيماتودي جهازي وبالملامسة

المورد: اجريساينسز تاريم
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات المبيدات — مبيدات نيماتودا

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
فيناميفوس	40%

التعريف

مبيد نيماتودي فوسفوري عضوي جهازي وبالملامسة للقضاء على العديد من أنواع النيماتودا المختلفة

الخصائص والمميزات

- ستوريون : مبيد نيماتودي جهازي يعمل بالملامسة يمتص من الجذور وينتقل للأوراق له تأثير متبقي طويل الأمد
- ستوريون : ينتشر بسرعة في التربة ولا يتحلل بسهولة في الماء ولكن يتحلل بسرعة كبيرة عند تعرضه للضوء
- ستوريون : له تأثير فعال في مكافحة النيماتودا سواء الخارجية أو الداخلية و النيماتودا المتحوصلة ونيماتودا تعقد الجذور
- ستوريون : له تأثير جانبي علي الحشرات الماصة والعناكب وحشرات التربة

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد (phi)
الموالح	نيماتودا التدهور البطئ	3 لتر / الفدان	30 يوم

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد (phi)
العنب	نيماتودا تعقد الجذور	2.5 لتر / الفدان	60 يوم
الموز	نيماتودا تعقد الجذور	12 سم^3 / جورة	7 أيام
بنجر السكر	نيماتودا تعقد الجذور	3 لتر / الفدان	45 يوم
البطاطس	نيماتودا تعقد الجذور	2.5 لتر / الفدان	42 يوم

فترة تكسير المبيد : يتكسر 50 % من المبيد في التربة جيدة التهوية خلال 7 : 15 يوم ولا تتأثربنسبة الرطوبة أو الحرارة

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

لا يخلط المبيد مع المبيدات والأسمدة الأخري ويمكن إجراء تجربة قبل أو بعد إستخدام المبيد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: الفوسفور العضوي Organophosphorus