زيروكلو EC%24

مبيد حشائش رفيعة إختياري جهازي

المورد: اجريساينسز تاريم
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات المبيدات — مبيدات حشائش

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
كليثوديم	24%

التعريف

مبيد حشائش جهازي إختياري يستخدم بعد الإنبات على 2 : 5 ورقات لمكافحة الحشائش الرفيعة الحولية والمعمرة في محاصيل الخضر والفاكهة

الخصائص والمميزات

- زيروكلو مبيد حشائش جهازي عالي الاختيارية ذو كفاءة في النتائج سريعة جداً في السيطرة على الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة مثل (الزمير والصامة والفلارس وديل الفأر وقمح العصافير وأبو ركبة والحمرة والنجيل البلدي)
- زيروكلو توقف نمو الحشائش خلال أسبوع من تاريخ الرش وتتحول أنسجة الحشائش في مناطق النموات الحديثة للون البني ثم تتعفن بعد ذلك وتتحول الأوراق الحديثة إلى اللون الأصفر ثم تموت وتتحول الأوراق القديمة إلى اللون البرتقالي ثم الأحمر ثم الأرجواني أو البني المسود ثم تموت

معدلات الاستخدام

مراعاة ضبط درجة حموضة محلول الرش مع مادة لاصقة لزيادة الكفاءة

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الحشائش المستهدفة	معدل الإستخدام	PHI
الطماطم الشتل	الحشائش النجيلية الحولية	250 سم^3 / 100 لتر ماء	45 يوم

التوصيات العالمية

المحصول	الحشائش المستهدفة	معدل الإستخدام	PHI
الفول السوداني	الحشائش الرفيعة الحولية	500 سم^3 / الفدان	70 يوم
البصل الفتيل	الحشائش االرفيعة الحولية	150 سم^3 / الفدان	60 يوم
بنجر السكر	الحشائش الرفيعة الحولية	250 سم^3 / الفدان	70 يوم

- الحشائش النجيلية الحولية (250 : 500 سم^3) / الفدان على 100 : 200 لتر ماء
- الحشائش النجيلية المعمرة (750 سم^3) / الفدان على 100 : 200 لتر ماء
- طريقة ومرحلة الإستخدام : يتم التطبيق على الحشائش الرفيعة الحولية و النجيلية المعمرة رشاً عاماً على النباتات (عندما تكون الحشائش في حالة نشاط) فيجب توافر نسبة رطوبة جيدة بالتربة لزيادة حركة العصارة وقبل مرحلة تكوين التقاوي في الحشائش مما يعيق حركة العصارة للحصول على أفضل النتائج .

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: سيكلوهكساندايون أوكسيم